

## Dżdżownice- rozpoznaj swoich darmowych pracowników



**Dżdżownica ziemna** (*Lumbricus terrestris*) jest największą dżdżownicą występującą w Polsce. Podczas ruchu może osiągać nawet 35 cm długości. Żyją w głębokich pionowych kanalikach. W nocy wychodzą na powierzchnię gleby, w celu poszukiwania pożywienia. Wtedy zasysają do swoich kanalików resztki roślinne. Na średniej klasy trawniku jest ich 20–40 na metrze kwadratowym.



**Allolobophora chlorotica** jest popularną dżdżownicą we wszystkich stanowiskach, jednakże najbardziej preferuje siedliska kwaśne. Występuje w dwóch barwach. Może osiągać do 8 cm w ruchu. Gdy zakłócany jest jej sposób wydziela przez pory zieloną ciecz.



**Aporrectodea caliginosa** jej ciało jest blade. Łatwa w rozpoznawaniu ponieważ posiada różne odcienie wzdłuż ciała. Z reguły są to 3 odcienie w przedniej części dżdżownicy. Dorosły osobnik osiąga 6 cm długości. Występuje powszechnie w Polsce, głównie w warstwie podpowierzchniowej.



**Lumbricus rubellus** jest rozpowszechnionym gatunkiem występującym w większości siedlisk. Żyje w ściółce warstwy ornej i w liściach uważa się, że żeruje na materii organicznej. Typowa wielkość dorosłego osobnika to 6,5 cm. Górna powierzchnia korpusu z pierwszego segmentu jest całkowicie ciemna (czerwono-brązowy). Dżdżownica czasem spłaszcza ogonek w kształcie łopaty.



**Aporrectodea longa** występuje umiarkowanie często (5-20 osobników na metr kwadratowy) w glebach alkalicznych w terenach otwartych takich jak ogrody, łąki i pastwiska oraz grunty orne.



**Aporrectodea rosea** występuje powszechnie w wierzchniej części warstwy ornej. Typowa wielkość dorosłego osobnika to ok. 5 cm. Robak ten ciało ma zazwyczaj różowe z charakterystycznym brązowo-żółtym siodełkiem.